

CHECK-LIST
OF
COLEOPTERA OF JAPAN

日本産甲虫目録

No. 11

December 30, 1977

The Coleopterists' Association of Japan
c/o Department of Zoology, National Science Museum (Nat. Hist.),
3-23-1 Hyakunin-chô, Shinjuku, Tokyo 160, Japan

Family ELATERIDAE コメツキムシ科
(HEMIRHIPINAE, AGRYPNINAE, CHALCOLEPIDINAE)

By

Hitoo ÔHIRA

Subfamily HEMIRHIPINAE クシヒゲコメツキ亜科

Genus *Tetrigus* CANDÈZE, 1857 オオクシヒゲコメツキ属

Tetrigus CANDÈZE, 1857, Mon. Élat., 1, p. 201, 254 (type-species: *Tetrigus parallelus* CANDÈZE, 1857).

T. kusuui ÔHIRA, 1974 オガサワラクシヒゲコメツキ

ÔHIRA, 1974, Kontyû, Tokyo, 42, p. 24, figs. 1, 4, A (Chichi-jima).

Distr.: Bonin Is. (Chichi-jima).

T. lewisi CANDÈZE, 1873 オオクシヒゲコメツキ

CANDÈZE, 1873, Mém. Soc. Sc. Liége, (2), 5, p. 6 (Japon).

grandis LEWIS, 1879, Ent. mon. Mag., 16, p. 155 (Nagasaki).

Distr.: Japan (Hokkaido, Honshu, Mikura-jima, Shikoku, Oki-no-shima, Kyushu, Tsushima, Tane-ga-shima), Bonin Is. (Chichi-jima), Ryukyu Is. (Amami-Oshima, Toku-no-shima, Okinawa-honto, Ishigaki-jima), Korea, China, Taiwan, Laos, Viet-num.

T. okinawensis ÔHIRA, 1967 ヒメクシヒゲコメツキ

ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 96, figs. 1, 2 (Okinawa, Amami-Oshima).

Distr.: Ryukyu Is. (Amami-Oshima, Okinawa-honto).

Subfamily AGRYPNINAE サビキコリ亜科

Genus *Agrypnus* ESCHSCHOLTZ, 1829 サビキコリ属

Agrypnus ESCHSCHOLTZ, 1829, Thon Ent. Arch., 2, p. 32 (type-species: *Elater murinus* LINNÉ, 1758).

- Paralacon* REITTER, 1905, Verh. naturf. Ver. Brunn, 43, Abhandlungen, p. 6.
Neolacon MIWA, 1929, Trans. nat. Hist. Soc. Formosa, 19, p. 234.
Cryptolacon NAKANE et KISHII, 1955, Bull. Osaka Mun. Mus. nat. Hist., (2), p. 1.
Sagojyo KISHII, 1964, Bull. Heian High School, Kyoto, (8), p. 30 (subgenus of
Colaulon ARNETT, 1952).

Subgenus *Agrypnus* ESCHSCHOLTZ, 1829, s. str.

- A. (A.) *binodulus* (MOTSCHULSKY, 1861) サビキコリ
 MOTSCHULSKY, 1861, Étud. ent., 9, p. 8 (*Lacon*) (Japon).
albomaculatus MIWA, 1934, Fauna Elat. Japan, p. 68, pl. 1, fig. 7 (*Lacon*) (Honshu:
 Gifu).
 Distr.: Japan, Corea.
 subsp. *binodulus* (MOTSCHULSKY), s. str. (サビキコリ)
 MOTSCHULSKY, 1861, ibid., 9, p. 8 (*Lacon*) (Japon).
 Distr.: Japan (Hokkaido, Honshu, Sado-ga-shima, Izu Is. Oki-shima, Shikoku,
 Oki-no-shima, Kyushu, Tane-ga-shima, Yakushima).
 subsp. *coreanus* KISHII, 1961 (チヨウセンサビキコリ)
 KISHII, 1961, Bull. Heian High School, Kyoto, (5), p. 13, 24, pl. 1, figs. 4–6
 (Tsushima I., Corea).
 Distr.: Japan (Tsushima), Corea.
- A. (A.) *bipapulatus* (CANDÈZE, 1865) シロマダラサビキコリ
 CANDÈZE, 1865, Élat. nouv., 1, p. 11 (*Lacon*) (Chine).
 Distr.: China, Taiwan, Ryukyu Is.
 subsp. *sakishimanus* ÔHIRA, 1967 (サキシマムナビロサビキコリ)
 ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 100, fig. 9 (Ishigaki, Iriomote).
 Distr.: Ryukyu Is. (Tokara, Amami, Okinawa and Yaeyama groups).
- A. (A.) *cordicollis* (CANDÈZE, 1865) ムナビロサビキコリ
 CANDÈZE, 1865, Élat. nouv., 1, p. 9 (*Lacon*) (Japan).
 Distr.: Japan (Hokkaido, Honshu, Sado-ga-shima, Shikoku, Kyushu).
- A. (A.) *formosanus* (BATES, 1866) タイワンオオサビキコリ
 BATES, 1866, Proc. zool. Soc. London, 2, p. 348 (*Lacon*) (Formosa).
 Distr.: Ryukyu Is. (Miyako-jima, Iriomote-jima), Taiwan.
- A. (A.) *miyakei* ÔHIRA, 1967 ミヤケオオサビキコリ
 ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 100, fig. 8 (Amami-Oshima, Toku-no-
 shima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Amami-Oshima, Toku-no-shima, Okinawa-honto).
- A. (A.) *oshimanus* ÔHIRA, 1969 オオシマサビキコリ
 ÔHIRA, 1969, Bull. Aichi Univ. of Educ., 18 (Nat. Sci.), p. 91, fig. 1, pl. 1, fig. B
 (Amami-Oshima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Amami-Oshima).
- A. (A.) *scutellaris* (CANDÈZE, 1893) シロモンサビキコリ
 CANDÈZE, 1893, Élat. nouv., 5, p. 9 (*Lacon*) (Liu-ku: Oshima).
 Distr.: Ryukyu Is.
 subsp. *scutellaris* (CANDÈZE), s. str. (シロモンサビキコリ)
 CANDÈZE, 1893, ibid., 5, p. 9 (*Lacon*) (Liu-ku: Oshima).

Distr.: Ryukyu Is. (Tokara and Amami groups).
 subsp. *hamai* ÔHIRA, 1967 (サキシマシロモンサビキコリ)
 ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 99 (Iriomote).
 Distr.: Ryukyu Is. (Ishigaki-jima, Iriomote-jima).

Subgenus *Sabikikorius* NAKANE et KISHII, 1955

Sabikikorius NAKANE et KISHII, 1955, Bull. Osaka Mun. Mus. nat. Hist., (2), p. 3
 (type-species: *Lacon fuliginosus* CANDÈZE, 1865).

A. (*S.*) *amamiensis* (MIWA, 1934) アマミホソサビキコリ

Miwa, 1934, Fauna Elat. Japan, p. 248 (*Paralacon*) (Amami-Oshima).
 Distr.: Ryukyu Is.
 subsp. *amamiensis* (MIWA), s. str. (アマミホソサビキコリ)
 Miwa, 1934, ibid., p. 248 (*Paralacon*) (Amami-Oshima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Takara-jima, Amami-Oshima).
 subsp. *okinawana* (ÔHIRA, 1967) (オキナワホソサビキコリ)
 ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 101 (*Adelocera*) (Okinawa).
 Distr.: Ryukyu Is. (Okinawa-honto).

A. (*S.*) *arenicola* NAKANE et KISHII, 1955 オオホソサビキコリ

NAKANE & KISHII, 1955, Bull. Osaka Mun. Mus. nat. Hist., (2), p. 3 (Takara-jima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Takara-jima, Amami-Oshima).

A. (*S.*) *fuliginosus* (CANDÈZE, 1865) ホソサビキコリ

CANDÈZE, 1865, Élat. nouv., 1, p. 10 (*Lacon*) (Japon).
 Distr.: Japan (Honshu, Izu Is., Shikoku, Kyushu, Yakushima, kuchinoerabu-jima).

A. (*S.*) *sakaguchii* (MIWA, 1927) サカグチホソサビキコリ

Miwa, 1927, Ins. Matsum., 2, p. 14, pl. 1, fig. 3 (*Lacon*) (Okinawa-honto).
 Distr.: Ryukyu Is. (Okinawa-honto, Ishigaki-jima, Iriomote-jima, Yonaguni-jima),
 Taiwan.

A. (*S.*) *setiger* (BATES, 1866) トビイロサビキコリ

BATES, 1866, Proc. zool. Soc. Lond., 2, p. 348 (*Lacon*) (Formosa).
 Distr.: Ryukyu Is. (Iriomote-jima), Taiwan.

A. (*S.*) *taciturnus* (CANDÈZE, 1874) チュウガタホソサビキコリ

CANDÈZE, 1874, Révis. Mon. Élat., p. 60 (*Lacon*) (Laôs).
 Distr.: Loas, Viet-nam, Cambodia, Burma, Taiwan, Ryukyu Is.

subsp. *koshunensis* (MIWA, 1929) (チュウガタホソサビキコリ)

Miwa, 1929, Trans. nat. Hist. Soc. Formosa, 19, p. 233 (*Paralacon*) (Formosa).
 Distr.: Ryukyu Is. (Okinawa-honto, Ishigaki-jima, Iriomote-jima), Taiwan.

Subgenus *Colaulon* ARNETT, 1952

Colaulon ARNETT, 1952, Wasmann Journ. Biol., 10, p. 116 (type-species: *Elater rectangularis* SAY, 1825).

A. (*C.*) *haterumana* (ÔHIRA, 1967) ハテルマヒメサビキコリ

ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 104, fig. 15 (*Colaulon*) (Hateruma-jima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Hateruma-jima).

- A. (C.) *hyponicola*** (KISHII, 1964) コガタヒメサビキコリ
 KISHII, 1964, Bull. Heian High School, Kyoto, (8), p. 33, pl. 1, figs. 5, 7, pl. 3,
 fig. 9 (*Colaulon*) (Honshu: Kyôto).
 Distr.: Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu).
- A. (C.) *miyakoensis*** (ÔHIRA, 1969) ミヤコヒメサビキコリ
 ÔHIRA, 1969, Bull. Aichi Univ. of Educ., 18 (Nat. Sci.), p. 93, pl. 1, fig. E, fig. 2
 (*Colaulon*) (Miyako-jima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Miyako-jima, Ishigaki-jima, Uotsuri-jima).
- A. (C.) *miyamotoi*** (NAKANE et KISHII, 1955) ハマベヒメサビキコリ
 NAKANE & KISHII, 1955, Bull. Osaka Mun. Mus. nat. Hist., (2), p. 2, pl. 1, fig. 1,
 pl. 2, figs. 6, 11, 13, 20 (*Cryptolacon*) (Takara-jima).
 Distr.: Japan, Ryukyu Is.
 subsp. *miyamotoi* (NAKANE et KISHII), s. str. (ハマベヒメサビキコリ)
 NAKANE & KISHII, 1955, ibid., p. 2 (*Cryptolacon*) (Takara-jima).
 Distr.: Japan (Kyushu: Tsushima), Ryukyu Is. (Naka-no-shima, Takara-jima).
 subsp. *tsukamotoi* (KISHII, 1956) (ハマベオオヒメサビキコリ)
 KISHII, 1956, Akitu, 5, p. 18 (*Cryptolacon*) (Is. Hegura).
 Distr.: Japan (Honshu, Sado-ga-shima, Shikoku, Oki-no-shima, Kyushu, Kuchino-erabu-jima, Yakushima).
 subsp. *ihai* (ÔHIRA, 1967) (イハヒメサビキコリ)
 ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 104 (*Colaulon*) (Ie-jima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Okinawa-honto, Ie-jima).
- A. (C.) *nagaoi*** (ÔHIRA, 1966) ナガオミヅムネヒメサビキコリ
 ÔHIRA, 1966, Bull. Japan ent. Academy, 2, p. 7, figs. A, D, (*Coaulon*) (Amami-Oshima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Amami-Oshima, Okinawa-honto, Iriomote-jima), Taiwan.
- A. (C.) *scrofa*** (CANDÈZE, 1873) ヒメサビキコリ
 CANDÈZE, 1873, Mém. Soc. Sc. Liége, (2), 5, p. 4 (*Lacon*) (Japon).
 Distr.: Japan, Ryukyu Is.
 subsp. *scrofa* (CANDÈZE), s. str. (ヒメサビキコリ)
 CANDÈZE, 1873, ibid., p. 4 (*Lacon*) (Japon).
 Distr.: Japan (Hokkaido, Honshu, Sado-ga-shima, Shikoku, Kyushu).
 subsp. *amamiensis* (KISHII, 1974) (アマミヒメサビキコリ)
 KISHII, 1974, Bull. Heian High School, Kyoto, (18), p. 3, fig. 8 (*Colaulon*) (Amami-Oshima).
 Distr.: Ryukyu Is. (Amami-Oshima).
- A. (C.) *scrofilla*** (ÔHIRA, 1969) チャイロヒメサビキコリ
 ÔHIRA, 1969, Trans. Shikoku ent. Soc., 10, p. 43, figs. 2, 4, B (*Colaulon*) (Izu-Oshima).
 Distr. Izu Is. (Oshima).
- A. (C.) *yuppe*** (KISHII, 1964) ミヅムネヒメサビキコリ
 KISHII, 1964, Bull. Heian High School, Kyoto, (8), p. 31, pl. 2, figs. 1, 2, 7, 9 (*Coaulon*) (Kuchi-no-erabu-jima).
 Distr.: Japan (Kyushu: Kuroshima, Kuchi-no-erabu-jima), Ryukyu Is. (Amami-Oshima, Okinawa-honto, Ishigaki-jima, Iriomote-jima).

Genus *Adelocera* LATREILLE, 1829 ホソサビキコリ属

Adelocera LATREILLE, 1829, Cuvier's Regne Anim., 4, p. 451 (type-species: *Elater ovalis* GERMAR, 1824).
Aganolacon ÔHIRA, 1967, Kontyû, Tokyo, 35, p. 55 (subgenus of *Brachylacon* MOTSCHULSKY, 1858).

Subgenus *Brachylacon* MOTSCHULSKY, 1858

Brachylacon MOTSCHULSKY, 1858, Étud. ent., 7, p. 60 (type-species: *Brachylacon microcephalus* MOTSCHULSKY, 1858).

A. (B.) *brunneus* (LEWIS, 1894) ミゾムネチビサビキコリ

LEWIS, 1894, Ann. Mag. nat. Hist., (6), 13, p. 29 (*Lacon*) (Oyama).
Distr.: Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu), Ryukyu Is. (Amami-Oshima).

A. (B.) *difficilis* (LEWIS, 1894) シロオビチビサビキコリ

LEWIS, 1894, ibid., p. 29 (*Lacon*) (Nagasaki).
Distr.: Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu, Tushima, Yakushima), Ryukyu Is. (Tokara, Amami, Okinawa and Yaéyama groups), Taiwan.

A. (B.) *shirozui* (ÔHIRA, 1967) シロウズチビサビキコリ (新)

ÔHIRA, 1967, Kontyû, Tokyo, 35, p. 55 (*Brachylacon*) (Taiwan).
Distr.: Taiwan.

subsp. *ishigakiensis* (ÔHIRA, 1967) (イシガキチビサビキコリ)

ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 105 (*Brachylacon*) (Ishigaki).
Distr.: Ryukyu Is. (Ishigaki-jima).

A. (B.) *tumens* (CANDÈZE, 1873) ヒメミゾムネチビサビキコリ

CANDÈZE, 1873, Mém. Soc. Sc. Liége, (2), 5, p. 4 (*Lacon*) (Japon).
Distr.: Japan (Kyushu?), Taiwan.

Genus *Meristhus* CANDÈZE, 1857 スナサビキコリ属

Meristhus CANDÈZE, 1857, Mon. Élat., 1, p. 162 (type-species: *Elater lepidotus* PALISOT de BEAUVOIS, 1805).

Subgenus *Sulcimerus* FLEUTIAUX, 1947

Sulcimerus FLEUTIAUX, 1947, Notes Ent. chin., 11, p. 242, 255 (type-species: *Meristhus quadripunctatus* CANDÈZE, 1857).

M. (S.) *nipponensis* LEWIS, 1894 スナサビキコリ

LEWIS, 1894, Ann. Mag. nat. Hist., (6), 13, p. 30 (Niigata).
Distr.: Japan (Honshu, Shikoku, Kyushu).

Genus *Rismethus* FLEUTIAUX, 1947 ケシツブサビキコリ属 (新称)

Rismethus FLEUTIAUX, 1947, Notes Ent. chin., 11, p. 242, 257 (type-species: *Meristhus scobinula* CANDÈZE, 1857).

R. *scobinula* (CANDÈZE, 1857) ケシツブスナサビキコリ

CANDÈZE, 1857, Mon. Élat., 1, p. 164, t. 2, fig. 26 (*Meristhus*) (Chine, Mexique).
subsp. *scobinula* (CANDÈZE, 1857), s. str.
CANDÈZE, 1857, ibid., p. 164. (*Meristhus*) (Chine, Mexique).
Distr.: Japan (Kyushu), Ryukyu Is. (Naka-no-shima, Takara-jima, Ishigaki-jima),

Hateruma-jima), Taiwan, China.

Subfamily CHALCOLEPIDIINAE ウバタマコメツキ亜科

Genus *Anthracalaus* FAIRMAIRE, 1888 オオヒラタコメツキ属

Anthracalaus FAIRMAIRE, 1888, Ann. Soc. ent. France, (6), 8, p. 349 (type-species: *Anthracalaus moricei* FAIRMAIRE, 1888).

A. sakaguchii (MIWA, 1929) サカグチオオヒラタコメツキ

MIWA, 1929, Trans. nat. Hist. Soc. Formosa, 19, p. 348 (*Pristilophus*) (Okinawashima), *comb. n.*

magnus MIWA, 1929, ibid., p. 349 (Okinawashima).

Distr.: Ryukyu Is. (Okinawa-honto, Ishigaki-jima, Iriomote-jima, Yonaguni-jima).

Genus *Paracalais* NEBOISS, 1967 ウバタマコメツキ属

Paracalais NEBOISS, 1967, Proc. roy. Soc. Victoria, 80, p. 261 (type-species: *Alaus suboculatus* CANDÈZE, 1857).

P. berus (CANDÈZE, 1864) ウバタマコメツキ

CANDÈZE, 1864, Élat. nouv., 1, p. 15 (*Alaus*) (Japon).

Distr.: Japan (Honshu, Miyake-jima, Shikoku, Oki-no-shima, Kyushu, Tsushima, Yakushima, Kuchi-no-erabu-jima), Ryukyu Is. (Naka-no-shima, Amami-Oshima, Toku-no-shima, Okinawa-honto, Yonaguni-jima), Taiwan, Laos, Viet-num.

P. larvatus (CANDÈZE, 1874) オオフタモンウバタマコメツキ

CANDÈZE, 1874, Révis. Mon. Élat., p. 141 (*Alaus*) (Chine).

Distr.: Bonin Is., Ryukyu Is., Taiwan, China, Viet-num.

subsp. *larvatus* (CANDÈZE), s. str. (オオフタモンウバタマコメツキ)

CANDÈZE, 1874, ibid., p. 141 (*Alaus*) (Chine).

Distr.: Ryukyu Is. (Naka-no-shima, Amami-Oshima, Toku-no-shima, Okinawa-honto, Ishigaki-jima, Iriomote-jima, Yonaguni-jima), Bonin Is. (Chichi-jima, Haha-jima), Taiwan, China, Viet-num.

subsp. *pini* (LEWIS, 1894) (フタモンウバタマコメツキ)

LEWIS, 1894, Ann. Mag. nat. Hist., (6), 13, p. 30 (*Alaus*) (Nagasaki, Kumamoto, Konose, Hagi).

satoi ÔHIRA, 1964, Kontyû, Tokyo, 32, p. 235, fig. 1, D (*Alaus*) (Tsushima), *syn. n.*

Distr.: Japan (Honshu, Shikine-jima, Miyake-jima, Mikura-jima, Kammuri-jima, Shikoku, Oki-no-shima, Kyushu, Shimo-koshiki-jima, Kuro-shima, Yakushima).

P. yamato (NAKANE, 1957) オオウバタマコメツキ

NAKANE, 1957, Sci. Rep. Saikyo Univ. (Nat. & Liv. Sci.), 2(4), A, p. 43, fig. 3 (*Alaus*) (Nara: Kasuga-yama).

Distr.: Japan (Honshu, Shikoku).

Genus *Lacon* CASTELNAU, 1836 サビコメツキ属

Lacon CASTELNAU, 1836, Revue Ent., 4, p. 11 (type-species: *Elater atomarius* FABRICIUS, 1789).

Zalepia ARNETT, 1953, Coleopt. Bull., 7, p. 7 (subgenus of *Lacon* CASTELNAU, 1836).

Kobulacon CHÛJÔ & ÔHIRA, 1965, Mem. Fac. Lib. Arts and Educ., Kagawa Univ., (2)(69), p. 2 (subgenus of *Lacon* CASTELNAU, 1836).

L. parallelus (LEWIS, 1894) コガタノサビコメツキ

LEWIS, 1894, Ann. Mag. nat. Hist., (6), 13, p. 28 (*Adelocera*) (Sapporo).

Distr.: Japan, Ryukyu Is.

subsp. *parallelus* (LEWIS), s. str. (コガタノサビキコリ)

LEWIS, 1894, ibid., p. 28 (*Adelocera*) (Sapporo).

Distr.: Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku).

subsp. *amamiensis* ÔHIRA, 1967 (アマミコガタノサビコメツキ)

ÔHIRA, 1967, Trans. Shikoku ent. Soc., 9, p. 98 (Amami-Oshima).

Distr.: Ryukyu Is. (Amami-Oshima).

L. quadrinodatus LEWIS, 1894 コブサビコメツキ

LEWIS, 1894, Ann. Mag. nat. Hist., (6), 13, p. 28 (Oyama).

Distr.: Japan (Hokkaido, Honshu, Kyushu).

Subgenus *Alaotypus* SCHWARZ, 1902

Alaotypus SCHWARZ, 1902, Dtsche. ent. Z., p. 307 (type-species: *Alaotypus subpectinatus* SCHWARZ, 1902).

L. (A.) boninensis (ÔHIRA, 1970) オガサワラサビコメツキ

ÔHIRA, 1970, Gensei, (21), p. 11, figs. 1, 2 (*Alaotypus*) (Chichi-jima, Haha-jima).

Distr.: Bonin Is. (Chichi-jima, Haha-jima).

L. (A.) churakagi (ÔHIRA, 1971) クロサビコメツキ (新称)

ÔHIRA, 1971, Kontyû, Tokyo, 39, p. 39, figs. 1, A, 2, B, C (*Alaotypus*) (Iriomote-jima, Ishigaki-jima).

Distr.: Ryukyu Is. (Ishigaki-jima, Iriomote-jima).

L. (A.) maeklinii (CANDÈZE, 1865) オオサビコメツキ

CANDÈZE, 1865, Élat. nouv., I, p. 6 (*Adelocera*) (Japon).

antennata LEWIS, 1894, Ann. Mag. nat. Hist., (6), 13, p. 27 (*Adelocera*) (Sapporo).

Distr.: Japan (Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu, Yakushima).

L. (A.) maenamii (ÔHIRA, 1969) マエナミサビコメツキ

ÔHIRA, 1969, Trans. Shikoku ent. Soc., 10, p. 41, figs. 1, 4, A (*Alaotypus*) (Hachijo-jima).

Distr.: Izu Is. (Miyake-jima, Hachijo-jima).

L. (A.) yayeyamana (MIWA, 1934) ヤエヤマサビコメツキ

MIWA, 1934, Fauna Elat. Japan, p. 246 (*Adelocera*) (Ishigaki Is.).

Distr.: Japan (Kyushu: Kuroshima), Ryukyu Is. (Tokara, Amami, Okinawa and Yaéyama groups).

Agrypninae 亜科については、HAYEK (1973) の広範な研究が公にされ、属や亜属は大幅に統合された。この分類体系は、大筋において正しいものと判断されるので、このリストもほぼその見解に従って作成した。なお、本亜科の属や亜属の位置づけについて、筆者なりに再検討も加えているので、これについてはいざれ明らかにするつもりである。