

とよく一致した。このような個体は箱根においては出現率は低いようである。

これによって、ハコネアシナガコガネ・イノウエスジコガネの2種がともに、箱根地方と伊豆半島に産することになり、しかも他地方からは未見であるということになった。このようにコガネムシ科の個有種が2種あるということは、野村氏のいわれるように分布上興味深いことである。

注1) イノウエスジコガネは *Mimela inouei* として扱われることもある。現在まで知られている産地は下記のとおり。

1. 静岡県大滝温泉(模式産地)(野村, 昆虫学評論, 19(2), p. 56, 1967)
2. 静岡県伊豆・達磨山(石田, 月刊むし, 21号, p. 9, 1972)
3. 神奈川県仙石原(野村・小林, 昆虫学評論, 29(1/2), p. 41, 1976)
4. 静岡県伊豆・天城峠, 18巻, 16. Ⅶ. 1977, 石田・庄田採集(新記録)

注2) 箱根火山と伊豆半島との関係、さらにこの両者と伊豆諸島との関係については、生物地理学的に探究する方向と地学的に探究する方向とを合わせ用い、これを重ね合わせて考える必要があると思われる。

(〒168 杉並区宮前 3-23-5)

## 利尻島 6 月下旬のハムシ

今坂 正一

1975年6月26~28日の間、北海道宗谷支庁の利尻島で採集する機会を得た。3日間共小雨まじりの天候で気温も13~20°Cと低く虫の姿はあまり見られなかったが、この頃同地へ採集に訪れる人も少ないと思われるので、ハムシ科の採集品を報告しておく。

1. *Smaragdina aurita* (LINNAEUS)  
キボシルリハムシ  
3 exs., 鴛泊, 26. Ⅶ; 6 exs., 利尻岳, 28. Ⅶ
2. *Cryptocephalus nitidulus* FABRICIUS  
1 ex., 利尻岳, 28. Ⅶ
3. *C. pumilo* SUFFRIAN  
アイヌツツハムシ  
2 exs., 鴛泊, 26. Ⅶ; 6 exs., 利尻岳, 28. Ⅶ
4. *Basilepta balyi* (HAROLD)  
チャイロサルハムシ  
17 exs., 姫沼, 27. Ⅶ
5. *Bromius obscurus* (LINNAEUS)  
フキサルハムシ  
1 ex., 利尻岳, 28. Ⅶ
6. *Syneta adamsi* BALY  
カバノキハムシ  
21 exs., 利尻岳, 28. Ⅶ
7. *Pyrrhalta lineola* (FABRICIUS)

- ハンバミハムシ  
6 exs., 鴛泊, 26. Ⅶ; 20 exs., 利尻岳, 28. Ⅶ
8. *Galerucella grisescens* (JOANNIS)  
イチゴハムシ  
1 ex., 鴛泊, 26. Ⅶ
  9. *Fleutiauxia armata* (BALY)  
クワハムシ  
1 ex., 鴛泊, 26. Ⅶ; 1 ex., 姫沼, 27. Ⅶ
  10. *Stenoluperus nipponensis* (LABOISSIERE)  
ヒゲナガウスバハムシ  
18 exs., 鴛泊, 26. Ⅶ; 2 exs., 姫沼, 27. Ⅶ; 27 exs., 利尻岳, 28. Ⅶ
  11. *Luperus viridipennis murakamii* KIMOTO  
ムナキホソヒゲナガハムシ  
1 ex., 姫沼, 27. Ⅶ
  12. *Agelasa nigriceps* MOTSCHULSKY  
キクピアオハムシ  
2 exs., 鴛泊, 26. Ⅶ; 4 exs., 利尻岳, 28. Ⅶ
  13. *Gallerucida bifasciata* MOTSCHULSKY  
イタドリハムシ  
11 exs., 鴛泊, 26. Ⅶ; 5 exs., 姫沼, 27. Ⅶ
  14. *Aphthona perminuta* BALY  
ツブノミハムシ  
7 exs., 鴛泊, 26. Ⅶ; 3 exs., 姫沼, 27. Ⅶ; 12 exs., 利尻岳, 28. Ⅶ
  15. *Crepidodera japonica* BALY  
ミドリトビハムシ  
14 exs., 鴛泊, 26. Ⅶ; 5 exs., 姫沼, 27. Ⅶ
  16. *Chaetocnema concinna* (MARSHALL)  
3 exs., 利尻岳, 28. Ⅶ
- 以上16種のうち、*C. nitidulus* は H. TAKIZAWA (1975)<sup>1)</sup> によって北海道と利尻島の分布が報告されたばかりである。平安高校生物部の報告(1976)<sup>2)</sup>にはこの種(*C. approximatus* として記録)を含めて、利尻島産ハムシ48種が記録されている。
- 今回、イチゴハムシ・キクピアオハムシ・イタドリハムシの3種が新たに追加されたことになる。

1) H. TAKIZAWA (1975): Kontyū, Tokyo, 43(4), pp. 422~436

2) T. KISHII (1976): The Bulletin of the Heian High School, (20), pp. 57~60, pp. 77~91

(〒855 島原市白土町 1064)