

【短報】ババチビドロムシの四国からの採集記録

ババチビドロムシ *Babalimnichus masamii* M. Satô は、本州（愛知県以西）、九州、屋久島、奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島、沖繩島、伊良部島、宮古島、石垣島、与那国島に広く分布する海岸岩礁性のチビドロムシの一種である（Satô, 1994；Yoshitomi, 1998；Yoshitomi & Satô, 2001；吉富・新井, 2004；中島, 2005）。今回、四国において本種を採集したので初記録として以下に報告する。

1 頭、高知県土佐清水市大岐海岸（N32.825942, E132.952166）、24. VII. 2011；1 頭、愛媛県松山市大浦（N33.997316, E132.76866）、13. VIII. 2011。いずれも吉富博之採集・保管。




図1. 生息環境：高知県土佐清水市大岐海岸。



図2. ババチビドロムシ（高知県土佐清水市大岐海岸）。

末筆ながら、高知県における野外調査にご同行頂いた原 佑介君と岡野良祐君にお礼申し上げる。

引用文献

- 中島 淳, 2005. ババチビドロムシの九州（宮崎県）からの採集記録. 甲虫ニュース, (151): 17-18.
Satô, M., 1994. Note on the genus *Pseudeucinetus* Heller and its new relative (Coleoptera, Limnichidae). Special Bulletin of

the Essa Entomological Society, Niigata, (2): 173-177.

Yoshitomi, H., 1998. A new record of *Babalimnichus masamii* (Coleoptera, Limnichidae) from Yakushima Island. Elytra, Tokyo, 26(1): 160.

吉富博之・新井浩二, 2004. ババチビドロムシの与那国島からの採集記録. 甲虫ニュース, (148): 23.

Yoshitomi, H., & M. Satô, 2001. Description of the larva of *Babalimnichus masamii* M. Satô (Coleoptera: Limnichidae, Thaumastodinae). Coleopterists Bulletin, 55 (4): 471-474.


(〒 790-8566 松山市樽味 3-5-7 愛媛大学農学部 吉富博之)

【短報】エンマムシ 2 種の採集記録

大原 (2001) によると、比較的記録の少ないエンマムシ 2 種を採集したので報告する。

1. スネビロツプエンマムシ *Abraeus loebli* Gomy et M. Ôhara, 2001 (図 1)

1♂, 新
潟県糸魚
川市蓮華
温泉（標高
1,500m）,
14. VIII.
2001, 大川



秀雄採集. 図1. スネビロツプエンマムシ.

雄の後脛 図2. クロアリヅカエンマムシ.

節内側に脛毛が生えており、顕著な特徴を持つエンマムシである（大原, 2001）。車道脇の広場にある石下より得た。

2. クロアリヅカエンマムシ *Hetaerius optatus* Lewis, 1884 (図 2)

1ex., 栃木県佐野市秋山町氷室山（標高 1,000m）, 15-21. V. 2011, 2exs., 同所, 29. VI-6. VII. 2011, 2exs., 同所, 6-12. VII. 2011, 大川秀雄採集.

山道脇に設置した FIT（フライト・インターセプト・トラップ）により得た。

引用文献

- 大原昌宏, 2001. 日本産エンマムシ上科概説 X. 甲虫ニュース, (136): 1-7.

(〒 326-0043 足利市助戸仲町 820-1 大川秀雄)